


# Anestésicos Generales

Anestesia intravenosa de uso veterinario



Propofol® Lipuro 1%, Tiobarbital

# Propofol® Lipuro 1%



Código	Volumen	Unidades de venta
448038	20 ml (ampolla)	5
448040	50 ml (frasco)	1
448039	100 ml (frasco)	1

## Indicaciones

- Inducción previa a la anestesia general
- Anestesia de corta duración para diferentes procedimientos
  - Exploración radiológica, de oídos y ojos
  - Procedimientos oftálmicos
  - Biopsia
  - Extracción de cuerpo extraño
  - Procedimientos dentales
  - Colocación de sondas y drenajes
  - Retirada de suturas
- Anestesia de media y larga duración para anestesia de mantenimiento
- Agente inductor de elección en cesárea (evita depresión cardiorrespiratoria en cachorros), pacientes de riesgo anestésico, galgos y cachorros

## Características

- Anestésico general intravenoso
- Destaca por su rápida metabolización, por tener una mínima acumulación en el organismo y un despertar rápido, suave y tranquilo
- Proporciona una recuperación rápida sin efectos secundarios
- Su formulación en emulsión MCT/LCT, a base de triglicéridos de cadena media (MCT) y triglicéridos de cadena larga (LCT) aporta ventajas importantes:
  - Menor concentración de propofol libre
  - Rápida metabolización
  - Preservación del sistema inmunitario
- Permite realizar una anestesia de mantenimiento mediante bomba, perfusor o gotero

# Tiobarbital (Tiopental sódico)



## Indicaciones

- Para la inducción de la anestesia general
- Anestésico total en intervenciones quirúrgicas de corta duración
- Para producir hipnosis durante la anestesia equilibrada con otros agentes
- Eutanasia, utilizado individualmente en sobredosis, o conjuntamente con otros fármacos (relajantes musculares)

## Características

- Anestésico general intravenoso de acción ultracorta

## Preparación

Se prepara la disolución en el propio vial, de forma que la solución resultante sea del 5%, es decir añadir 10 c.c. de agua bidestilada o suero fisiológico para la presentación de 0,5 g y 20 c.c. para la presentación de un gramo.

Una vez preparada la solución, ésta pierde actividad paulatinamente, por lo que no se recomienda utilizar una dilución con más de 24 h.

Código	Descripción	Volumen	Unidades de venta
346835	Tiobarbital 0,5 g	10 ml	50
346836	Tiobarbital 1 g	20 ml	50



**B. Braun VetCare SA**

Ctra. de Terrassa, 121  
08191 Rubí (Barcelona)

**Servicio Atención Clientes**

Tel.: 902 47 47 01  
Fax: 902 48 48 01  
[atencioncliente.vetcare@bbraun.com](mailto:atencioncliente.vetcare@bbraun.com)  
[www.bbraun-veterinaria.es](http://www.bbraun-veterinaria.es)