

CLORURO POTÁSICO 14,9% 2M.

Suplementación necesaria



CLORURO POTÁSICO 14,9% 2M.

Suplementación necesaria

Aproximadamente el 70% de las patologías requieren suplementación de potasio con la fluidoterapia de rehidratación

Más del 95% requieren suplementación de potasio con la fluidoterapia de mantenimiento

Objetivos:

- 1 Corregir deficiencias de potasio
- 2 Aportar las necesidades diarias en anoréxicos

Dosis:

Requerimientos de potasio en animales anoréxicos:
1,2 mEq/Kg/día

Pautas de suplementación:

En fluidoterapia de rehidratación:

- En casos de hipokalemia:
 - Sin valoración de potasio en sangre:
20 mEq/L (10 ml Cloruro Potásico 14,9% 2M B. Braun/L)
 - Según valoración de potasio sérico:

Potasio Sérico (mEq/L)	mEq KCl a añadir en 500 ml de suero.	ml Cloruro Potásico 14,9% 2M B. Braun a añadir en 500 ml de suero.	Velocidad máxima de infusión (mL/kg/h)
< 2.0	40	20	6
2.0 - 2.5	30	15	8
2.5 - 3.0	20	10	12
3.0 - 3.5	14	7	16

En fluidoterapia de mantenimiento:

- Con Fisiológico 0,9% (por litro de suero): 0,6 ml CIK 2M /kg/ día
- Con Lactato de Ringer (por litro de suero): 0,5 ml CIK 2M /kg/ día
- Con Esterofundina® Balance: No requiere suplementación



**VELOCIDAD MÁXIMA DE ADMINISTRACIÓN:
0,5 mEq/kg/h (0,25 ml CIK 2M/kg/h)**

B | BRAUN
AESCULAP

División Veterinaria

B. Braun Surgical SA
Ctra. de Terrassa, 121
08191 Rubí (Barcelona)

Servicios Atención Clientes
Teléfono 902 120 020
Telefax 93 697 45 28
e-mail: vet.es@bbraun.com