

Hipotensión intraoperatoria

¿Qué hacer?

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Fluidoterapia básica en todas las cirugías. Reposición de pérdidas intraoperatorias

5–20 ml/kg/h
Lactato-RingerVet/FisioVet

Hipotensión leve

1. Ajustar plano anestésico
2. Δ ritmo cristaloides isotónicos:
(Lactato-RingerVet/FisioVet)
perro 20–40 ml/kg/h
gato 10–20 ml/kg/h

Hipotensión moderada

1. Ajustar plano anestésico
2. Δ ritmo cristaloides isotónicos
perro 40–60 ml/kg/h
gato 20–40 ml/kg/h
3. ¿Un bolo de coloides 5 ml/kg?
4. ¿Simpaticomiméticos en infusión continua:
Dopamina 1–10 μ /kg/min?

Hipotensión severa

1. Ajustar plano anestésico
2. Δ ritmo cristaloides isotónicos
perro 40–90 ml/kg/h
gato 20–60 ml/kg/h
3. Bolos coloides 5 ml/kg (2–3 bolos)
4. Simpaticomiméticos en infusión continua:
Dopamina 1–10 μ /kg/min
5. ¿Bolo Hipertónico Salino 7,5% 2–5 ml/kg en 5 min?

