

LISTADO DE MEDICAMENTOS PARA INFUSIÓN CONTÍNUA DE URGENCIA

	Lidocaína 0.4% Braun® (40-80µg/ Kg/min)	NorAdrenalina Braun® (0.1-0.5µg/ Kg/min)	Propofol Braun® (100-400µg/Kg/min)	Medetomidina Sedastart® (1-3µg/Kg/h)	Furosemida (Seguril®) (0.2-1mg/Kg/h)	Dobutamina (2.5-10µg/Kg/min)	Metoclopramida (1-2mg/Kg/día)	Dopamina (5-20µg/Kg/min)	Butorfanol (0.1-0.4mg/Kg/h)	Midazolam (0.1-0.5mg/Kg/h)	Diazepam (0.1-0.5mg/Kg/h)	
Kg	ml/h	ml/h	ml/h	ml/h	ml/h	ml/h	ml/h	ml/h	ml/h	ml/h	ml/h	Kg
1	0.6-1.2	0.2-1	0.6-2.4	0.1-0.3	0.2-1	0.3-1.2	1-2	0.4-2	0.1-0.4	0.1-0.5	0.1	1
2	1.2-2.4	0.4-2	1.2-4.8	0.2-0.6	0.4-2	0.6-2.4	2-4	0.8-3	0.2-0.8	0.2-1	0.1-0.2	2
3	1.8-3.6	0.6-3	1.8-7.2	0.3-0.9	0.6-3	0.9-3.6	3-6	1.1-5	0.3-1.2	0.3-1.5	0.1-0.3	3
4	2.4-4.8	0.8-4	2.4-9.6	0.4-1.2	0.8-4	1.2-4.8	4-8	1.5-6	0.4-1.6	0.4-2	0.1-0.4	4
5	3-6	1-5	3-12	0.5-1.5	1-5	1.5-6	5-10	1.9-8	0.5-2	0.5-2.5	0.1-0.5	5
6	3.6-7.2	1.2-6	3.6-14.4	0.6-1.8	1.2-6	1.8-7.2	6-12	2.3-9	0.6-2.4	0.6-3	0.1-0.6	6
7	4.2-8.4	1.4-7	4.2-16.8	0.7-2.1	1.4-7	2.1-8.4	4-14	2.6-11	0.7-2.8	0.7-3.5	0.2-0.7	7
8	4.8-9.6	1.6-8	4.8-19.2	0.8-2.4	1.6-8	2.4-9.6	8-16	3-12	0.8-3.2	0.8-4	0.2-0.8	8
9	5.4-10.8	1.8-9	5.4-21.6	0.9-2.7	1.8-9	2.7-10.8	9-18	3.4-14	0.9-3.6	0.9-4.5	0.2-0.9	9
10	6-12	2-10	10-24	1-3	2-10	3-12	10-20	3.8-15	1-4	1-5	0.2-1	10
11	6.6-13.2	2.2-11	6.6-26.4	1.1-3.3	2.2-11	3.3-13.2	11-22	4.1-17	1.1-4.4	1.1-5.5	0.2-1.1	11
12	7.2-14.4	2.4-12	7.2-28.8	1.2-3.6	2.4-12	3.6-14.4	12-24	4.5-18	1.2-4.8	1.2-6	0.2-1.2	12
13	7.8-15.6	2.6-13	7.8-31.2	1.3-3.9	2.6-13	3.9-15.6	13-26	4.9-20	1.6-5.2	1.3-6.5	0.3-1.3	13
14	8.4-16.8	2.8-14	8.4-33.6	1.4-4.2	2.8-14	4.2-16.8	14-28	5.3-21	1.4-5.6	1.4-7	0.3-1.4	14
15	9-18	3-15	9-36	1.5-4.5	3-15	4.5-18	15-30	5.6-23	1.5-6	1.5-7.5	0.3-1.5	15
16	9.6-19.2	3.2-16	9.6-38.4	1.6-4.8	3.2-16	4.8-19.2	16-32	6-24	1.6-6.4	1.6-8	0.3-1.6	16
17	10.2-20.4	3.4-17	10.2-40.8	1.7-5.1	3.4-17	5.1-20.4	17-34	6.4-26	1.7-6.8	1.7-8.5	0.3-1.7	17
18	10.8-21.6	3.6-18	10.8-43.2	1.8-5.4	3.6-18	5.4-21.6	18-36	6.8-27	1.8-7.2	1.8-9	0.4-1.8	18
19	11.4-22.8	3.8-19	11.4-45.6	1.9-5.7	3.8-19	5.7-22.8	19-38	7.1-29	1.9-7.6	1.9-9.5	0.4-1.9	19
20	12-24	4-20	12-48	2-6	4-20	6-24	20-40	7.5-30	2-8	2-10	0.4-2	20
21	12.6-25.2	4.2-21	12.6-50.4	2.1-6.3	4.2-21	6.3-25.2	21-42	7.9-32	2.1-8.4	2.1-10.5	0.4-2.1	21
22	13.2-26.4	4.4-22	13.2-52.8	2.2-6.6	4.4-22	6.6-26.4	22-44	8.3-33	2.2-8.8	2.2-11	0.4-2.2	22
23	13.8-27.6	4.6-23	13.8	2.3-6.9	4.6-23	6.9-27.6	23-46	8.6-35	2.3-9.2	2.3-11.5	0.5-2.3	23
24	14.4-28.8	4.8-24	14.4-57.6	2.4-7.2	4.8-24	7.2-28.8	24-48	9-36	2.4-9.6	2.4-12	0.5-2.4	24
25	15-30	5-25	15-60	2.5-7.5	5-25	7.5-30	25-50	9.4-38	2.5-10	2.5-12.5	0.5-2.5	25
Diluciones		3ml de NorAdrenalina Braun® (1mg/ml) + 97 ml de Glucosado 5% Braun®	Propofol Braun® (10mg/ml) Bolo de inducción:1-4mg/Kg	1ml de Sedastart® (1mg/ml) + 99ml de Glucosado 5% Braun®+ Bolo:1-3µg/Kg	20ml de Seguril® (10mg/ml) + 80ml glucosado 5% Braun®+ Bolo:2-4mg/Kg	10ml de Dobutamina de (250mg/20ml)+ 240ml glucosado 5% Braun®	4.2ml de Metoclopramida (10mg/2ml)+ 500ml de Salino 0.9% Braun®	5ml de Dopamina (200mg/5ml)+ 245ml de glucosado 5% Braun® o salino 0.9% Braun® o Ringer Lactato Braun®	10ml de butorfanol (10mg/ml) + 90ml de glucosado 5% Braun® o salino 0.9% Braun® o Ringer Lactato Braun® (No recomendable más de 6h de infusión)	20ml de Midazolam (15mg/3ml)+ 80ml de glucosado 5% Braun® o salino 0.9% Braun®	El diazepam se infunde sin diluir, puesto que cristaliza y con equipo opaco. También se adhiere al plástico del equipo infusor.	
Observaciones								Mathews KA. "Veterinary emergency and critical care manual" 2007 Lifelearn	Mathews KA. "Veterinary emergency and critical care manual" 2007 Lifelearn		En status epiléptico se puede llegar a una dosis de 1mg/Kg/h	

